



氯雷他定胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：氯雷他定胶囊

英文名称：Loratadine Capsules

汉语拼音：Lüleitading Jiaonang

【成份】

本品每粒含氯雷他定10毫克。辅料为：玉米淀粉、微晶纤维素、低取代羟丙纤维素、聚维酮K30、硬脂酸镁。

【性状】本品内容物为白色或类白色颗粒或粉末。

【作用类别】本品为耳鼻喉科及皮肤科用药类非处方药药品。

【适应症】用于缓解过敏性鼻炎有关的症状，如喷嚏、流涕、鼻痒、鼻塞以及眼部痒及烧灼感。口服药物后，鼻和眼部症状及体征得以迅速缓解。亦适用于缓解慢性荨麻疹、瘙痒性皮肤病及其他过敏性皮肤病的症状及体征。

【规格】10毫克

【用法用量】

口服。成人及12岁以上儿童：一日1次，一次1粒（10毫克）。2-12岁儿童：体重>30公斤：一日1次，一次1粒（10毫克）。

【不良反应】

在每天10mg的推荐剂量下，本品未见明显的镇静作用。常见不良反应有乏力、头痛、嗜睡、口干、胃肠道不适包括恶心、胃炎以及皮疹等。罕见不良反应有脱发、过敏反应、肝功能异常、心动过速及心悸等。

【禁忌】特异体质的病人禁用。

【注意事项】

1. 严重肝功能不全的患者请在医生指导下

使用。

2. 妊娠期及哺乳期妇女慎用。

3. 在做皮试前约48小时左右应中止使用本品，因抗组胺药能阻止或降低皮试的阳性反应发生。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 同时服用酮康唑、大环内酯类抗生素、西咪替丁、茶碱等药物，会提高氯雷他定在血浆中的浓度，应慎用。其他已知能抑制肝脏代谢的药物，在未明确与氯雷他定相互作用前应谨慎合用。

2. 如与其它药物同时使用可能发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品为高效、作用持久的三环类抗组胺药，为选择性外周H1受体拮抗剂。可缓解过敏反应引起的各种症状。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】药用铝箔/聚氯乙烯固体药用硬片包装，规格为：10毫克×6粒/板×1板/盒；10毫克×7粒/板×1板/盒；10毫克×10粒/板×1板/盒；10毫克×12粒/板×1板/盒；10毫克×10粒/板×2板/盒。

【有效期】24个月。

【执行标准】《中国药典》2025年版二部。

【批准文号】国药准字H20051904

【说明书修订日期】2025年10月01日

【药品上市许可持有人】

名称：四川绿叶制药股份有限公司
注册地址：四川省泸州市龙马潭区鱼塘镇望江路二段六号、八号
商务电话：028-86635327
传真号码：028-86635365(商务咨询)

【生产企业】

企业名称：四川绿叶制药股份有限公司
生产地址：四川省泸州市龙马潭区鱼塘镇望江路二段六号、八号
邮政编码：646100
质量咨询及不良反应反馈电话：0830-2701406 028-86635332
传真号码：0830-2703647(质量咨询)

网 址：Http://www.scluye.com

如有问题可与生产企业联系

